## Comment reconnaître la maladie des feuilles du hêtre?

Les symptômes de la maladie des feuilles du hêtre Au printemps et en été:

- Bandes vertes foncées entre les nervures parallèles des feuilles (plus visibles observées par en-dessous)
- Feuilles épaisses, froissées et coriaces avec des bords recourbés
- Feuilles en forme de **cuvette** entre les nervures et feuilles petites





En automne et en hiver:

- Bandes brun jaunâtre sur les feuilles attachées et tombées
- La mort des bourgeons et le dépérissement des branches
- Amincissement de la canopée et dépérissement des arbres dans les 3 à 7 ans



### Pouvez-vous nous aider?

Un nématode foliaire, Litylenchus crenatae subsp. mccannii, est trouvé dans les feuilles et les bourgeons des hêtres malades.

La maladie des feuilles du hêtre et L. crenatae n'ont pas été signalés en Europe jusqu'à présent.

La maladie des feuilles du hêtre est incluse dans la liste d'alerte de l'OEPP. Cette liste contient des organismes nuisibles aux plantes qui peuvent présenter un risque phytosanitaire pour la région. Il est donc important de signaler les symptômes de la maladie du hêtre. Une détection précoce permet une mise en œuvre rapide des mesures de contrôle afin que la maladie du hêtre ne puisse pas s'établir.

Si vous repérez des symptômes

Signalez-le via observations.be/species/

**Q-organismen** 

Ajoutez une photo des dégâts et notez l'endroit précis.

## Plus d'infos?

#### Nicole Viaene

ILVO – Unité Plantes Burg. Van Gansberghelaan 96 9820 Merelbeke

nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be

Tel. 09 272 24 25







project FAGUSTAT



# Attention à la maladie des feuilles du hêtre!






## Distribution

## Management


### Plantes hôtes



La maladie des feuilles du hêtre a été détectée pour la première fois en Ohio, aux États-Unis, en 2012. Elle est désormais présente dans plus de 10 États du nord-est du pays et au Canada (Ontario). Le nématode dans des feuilles avec la maladie a aussi été trouvé dans les hêtres (Fagus crenatae) au Japon, mais n'y provoque pas le déclin des arbres.

La maladie du hêtre affecte les hêtres (*Fagus* spp.) dans les forêts, les paysages ouverts, les parcs, les arboretums et les jardins.

Le mode de propagation de la maladie du hêtre est encore inconnu mais on suspecte l'eau transportée par le vent, d'acariens, des insectes, oiseaux, faines ou plantes importées.





### Mesures phytosanitaires

- Évitez de déplacer le matériel de hêtre (branches, brindilles, feuilles, plantules et matériel de pépinière), le sol ou la matière organique des zones touchées.
- Inspectez le matériel de pépinière de hêtre pour détecter les symptômes de la maladie des feuilles du hêtre avant l'achat.
- N'importez pas illégalement du matériel de plantation de hêtre.





Jusqu'à présent, seuls les **hêtres** (*Fagus* spp.) ont été signalés comme étant touchés.

La maladie des feuilles du hêtre affecte Fagus grandifolia (hêtre américain), différents cultivars de notre commun F. sylvatica (hêtre européen) et F. orientalis (hêtre oriental).

D'autres espèces de hêtres (*F. engleriana*, *F. crenatae*,...) sont probablement aussi des hôtes.

