



Taimetervis

Taimed on meile olulised

80% meie toidulauast koosneb taimedest.

Taimetervise ajaloost

Kasulikud putukad on ülitähtsad, kuna nad tolmeldavad enamikku taimedest, hoiavad kahjureid kontrolli all, säilitavad mulla tervise ning toitainete ringluse.

Temperatuuri tõus süvendab veepuudust ning muudab taimed vastuvõtlikumaks taimetervisele.

Taimetervise ajaloost

Taimetervis e taimetervise on valdkond, mis kasutab mitmesuguseid ametlikke meetmeid kahjurite, haiguste ja umbrohtude tõrjeks, et ennetada taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.

Sõna „karantiin“ pärineb itaaliakeelsest sõnast *quaranta* ehk 'nelikümmend'. Esmalt hakati karantiini rakendama Itaalias 14. sajandil, mil enne sadamasse lubamist peeti 40 päeva kinni neid laevu, mis saabusid riikidest, kus esines katku. Karantiin tähendab tervishoius nakatunud või nakkuskolde viibinud inimeste teatud ajaks eraldamist.

Ka taimed võivad haigeks jääda ning seetõttu võeti see termin kasutusele, et kirjeldada tegevusi taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.

Võitlus taimede kaitsmise nimel haiguste ja kahjurite eest ulatub ajaloos kaugemale. Me teame, et Kesk-Ameerikast pärit taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.

Taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.

Esimene taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.



PMA



IPPC

Eesti ühines rahvusvahelise taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.



International Plant Protection Convention

www.ippc.int

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) võttis 1951. a. vastu rahvusvahelise taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.

Rahvusvahelise taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu.



EPPO Global Database

Näited taimetervise ajaloost, eriti inimtegevuse kaudu



Viljapuu-bakterpõletik

Bakterhaigus, mis kahjustab peamiselt õunapuid, pirnipuid, viirpuid, tuhkpuud, pihlakaid jt.




Männi-laguuss

Nematood, kes kahjustab peamiselt männipuude liike, aga võib elutseda ka teistes okaspuude liikides.



Xylella fastidiosa

Bakterhaigus, mis kahjustab üle 300 taimeliigi, näiteks viinapuid, oliivipuid ja kohvipuu taimi.




Aromia bungii

Kahjustab peamiselt toompuu perekonna puude liike, näiteks ploomipuu, kirsipuu, magus kirsipuu, virsikupuu ja toomingas.



Saare-salehundlane

Kahjustab peamiselt erinevaid saarepuude liike.



Aasia sikk

Kahjustab peamiselt vahtrapuude liike, harilikku hobukastanit, kasepuude liike, haabasid ja pajasid.

