

Üheks silmatorkavaks tunnuseks puu saastumisest on umbes 1 cm suuruse läbimõõduga ava puutüvel, mille kaudu täiskasvanuks saanud mardikas puust väljub. Lisaks sellele võib tähelepanu äratada ka vastsete tekitatud näripuru, mis tungib välja puukoore pragudest.



Näripuru. Foto: EPPO



Mardika väljumisava


## Kui märkad

**lehtpuudel aasia sikule omaseid elutegevuse jälgi, näripuru või elusaid mardikaid – tee neist fotod ning saada Põllumajandus- ja Toiduametile, e-post taimetervis@pta.agri.ee või maakonna esinduse taimeterwise peaspetsialistile.**

Pane leitud putukas plekist kaanega purki, torka kaanele mõned avad piisava õhuvaru tagamiseks ja too see lähimasse Põllumajandus- ja Toiduameti esindusse.

**Aasia siku varajase tuvastamisega hoia me Eesti loodust!**

## Aasia siku avastamisele saavad kaasa aidata kõik inimesed, kes liiguvad looduses!



Põllumajandus- ja Toiduamet

Teaduse 2

75501 Saku

HARJU MAAKOND

Meie esindused on avatud igas maakonnas

Oled oodatud!

Rohkem infot ja kontakte  
[www.pta.agri.ee](http://www.pta.agri.ee)



PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

# KARANTIINNE TAIMEKAHJUSTAJA

## Aasia sikk



## Hiinast pärit taimekahjustaja aasia sikk (*Anoplophora glabripennis*) ohustab erinevaid lehtpuuliike.

Aasia sikk on Euroopa Liidus karantiinne taimekahjustaja ning tema peremeestaimede ring on väga lai. Kahjuri varajane tuvastamine on keeruline, sest mardikas tegutseb maapinnast 1,5 m kõrgusel puu tüves ja võras.

Enim ohustatud puuliikideks on kask, vaher, harilik hobukastan, haab, pappel, paju, pihlakas, pärn, saar, jalakas, lepp.

Kahjuri senine levik Euroopas on näidanud, et **kõige suurem riskiallikas aasia siku sissetoomiseks** on Hiinast pärit puidust pakkematerjal, mida kasutatakse erinevate kaupade transportimisel. See on olnud peamine levimisviis nii Euroopasse kui Põhja-Ameerikasse. Eestis aasia sikk loodusest leitud ei ole.

## Kuidas kahjurit ja kahjustusi ära tunda

Aasia sikk on 2,5–3,5 cm pikkune läikiv musta värvi mardikas. Kattetiibadel on valged tähnid.

Putuka tundlad on musta-valgelülilised ning kehast peaaegu kaks korda pikemad.

Mardikad ilmuvad välja maikuus ja on aktiivsed oktoobrini.

**Meie looduses elab ka kohalikke putukkahjureid, kelle välimus ja kahjustuspilt sarnanevad aasia sikkule, kuid ei ole ohtlikud.**

Sarnased mardikad on kuuse-puidusikk, männi-puidusikk, pugalsikk.



Aasia sikk  
Foto: EVIRA. Salla Hannunen



Kuuse-puidusiku kattetiibade ülaosas on kollakas kilbike, aasia sikkul must

Aasia siku mardikas muneb ühekaupa munad elusate puude koorde näritud koonusjatesse lohkudesse ehk munemislehtrisse. Munad (5–7 mm) on pikliku kujuga kreemjat värvi.



Munemislehtrid

Suurimat kahju tekitavad lehtpuudele just kuni 5 cm pikkused vastsed, kes kaevandavad puidus ulatuslikke käike ning selle tulemusena oksad kuivavad ja muutuvad murdumisohtlikuks. Tugevalt kahjustunud puu sureb.



Vastne  
Foto: Evira. Ulla Oksanen