

## Соева нематода (*Heterodera glycines*)

**Симптоми ураження.** Надземна частина рослин виглядає пригніченою, листя жовтіє, боби відсутні з одночасним скороченням кількості бактеріальних бульбочок, рослини стають карликовими. Тому захворювання часто зустрічається під назвою «жовта карликовість сої». На поле уражені рослини зустрічаються невеликими вогнищами, які формуються в місцях первинного потрапляння цист в ґрунт, і поступово збільшуються в розмірах. Поступово вогнища ураження можуть зайняти всю площу полів



**Фітосанітарні заходи.** Заборона імпорту рослин та ґрунту із заражених зон країн поширення патогену. У разі виявлення вогнищ захворювання, їх локалізують та знищують.

**Способи поширення.** Розповсюдження нематод відбувається переважно пасивно, разом із зараженим рослинним матеріалом, знаряддями для обробітку ґрунту, птахами.

**У разі підозри щодо виявлення повідомляйте :**

м.Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 11  
тел/факс.: (0342) 78-35-77  
[fitolabif@ukr.net](mailto:fitolabif@ukr.net)

## Стеблова нематода картоплі (*Ditylenchus destructor* Thorne)

Дитиленхоз — захворювання, викликане ураженням стебловою нематоною картоплі. Стеблова нематода пошкоджує бульби та підземну частину стебел картоплі. Зовнішні ознаки захворювання на надземній частині вегетуючих рослин практично не спостерігаються, лише у виняткових випадках при дуже значному ураженні може спостерігатися пригнічення росту рослин картоплі. На підземній частині стебел в місцях скупчення нематод з'являються бурі видовжені плями зруйнованої тканини.

### Способи поширення

Весь цикл розвитку стеблової нематоди проходить всередині бульби, тому основним джерелом її розповсюдження є насіннєвий матеріал. Іншим джерелом зараження є ґрунт, куди нематоди потрапляють при розкладанні післязливних залишків та материнських бульб. У ґрунті стеблова нематода може зберігатися протягом декількох років, уражуючи інші культури.



### Заходи захисту:

- Використання сортів, стійких до нематоди.
- Саджання картоплі здоровими бульбами.
- Дотримання сівозміни.
- Дезинфекція тари, картоплексовищ, реманенту та транспортних засобів.
- Обробка бульб ефективними протруйниками, що дозволені для використання.



**У разі підозри щодо виявлення повідомляйте :**

м. Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 11  
тел/факс.: (0342) 78-35-77  
[fitolabif@ukr.net](mailto:fitolabif@ukr.net)